استفاده از تردمیل در بارداری✅ مفید یا ❌مضر؟

دوران بارداری دوران حساسی در وجود هر خانم و نیاز به آگاهی شناخت حفظ سلامتی جنین، سلامتی فرزند شما را در گرده خویش می گذارد. تصمیم می گیرید که در ایام بارداری ورزش کنید و ورزش و استفاده از تردمیل در دوران بارداری در کاهش اضطراب و نگرانی شما تاثیر بسیار دارد. ورزش روحیه و بهتری را برای شما به ارمغان می آورد و تولد نوزاد سالم را تقویت و مزه می دهد.

در این مقاله می خوانید

آیا می توانیم از تردمیل در ایام بارداری استفاده کنیم؟

در فعالیت های خود کمترین فشار عصبی را در نظر بگیرید. حرکات ۳۰ دقیقه در روز و حد ۵ روز پیچ در هفته کمترین کشت را. با متخصص در دوره تمرین ها و چگونگی آن ها مشورت کنید. مثلی نکنید از وزنش ثبت ببرید و به خاطر داشته باشید خودتان را سرزنش نکنید. اینها سلامتی شما و کودک آن ها در حین تمرین با تردمیل نگاه کنید.

ورزش تنفسی و انجام حداقل فعالیت بدنی به شما کمک می کند تمرین بدنی داشته باشید هر چند در دوران بارداری ممکن نیست تمریناتی در بدن شما صورت بگیرد و شما قادر باشید بتوانی حرکات کششی را به خوبی اجرا کنید. پس به خودتان ضعیف نباشید و فقط بر انجام تمرینات و انجام فعالیت.

نکات کلیدی استفاده از تردمیل در بارداری

در مواقع مختلف باید به نحو خوبی باید نکات کمتر این را رعایت کنید.

سه ماهه اول بارداری

تهیه استفاده از تردمیل در اول بارداری

در فعالیت های خود کمترین فشار عصبی را در نظر بگیرید. حرکات ۳۰ دقیقه در روز و حد ۵ روز پیچ در هفته کمترین کشت را. با متخصص در دوره تمرین ها و چگونگی آن ها مشورت کنید. مثلی نکنید از وزنش ثبت ببرید و به خاطر داشته باشید خودتان را سرزنش نکنید. اینها سلامتی شما و کودک آن ها در حین تمرین با تردمیل نگاه کنید.

ورزش تنفسی و انجام حداقل فعالیت بدنی به شما کمک می کند تمرین بدنی داشته باشید هر چند در دوران بارداری ممکن نیست تمریناتی در بدن شما صورت بگیرد و شما قادر باشید بتوانی حرکات کششی را به خوبی اجرا کنید. پس به خودتان ضعیف نباشید و فقط بر انجام تمرینات و انجام فعالیت.

سه ماهه دوم بارداری

تمرین ورزشی اصلی که در دوره سه ماه اول بارداری توصیه می شود، پیاده روی است. پیاده روی یکی از بهترین راه های حفظ تناسب اندام و تمرینات ورزشی دیگر است. اگر هفته دوازدهم به بعد شکم به طور محسوسی بزرگ می شود و در حین تمرین با تردمیل نگاه کنید. اگر تمرین های ورزشی دیگر را انجام می دهید، باید تمرین را کم کنید و از حرکت دادن به حالت اولیه خودداری کنید.

به محدودیت و توانایی های خود در تمرین آگاه باشید و به طبع هیچ سه ماه دوم، فشار نوزاد، سلامتی نوزاد شما توقعات دارد و بعد از آن، بارداری دیر می توانید بگیرد، بگیرد طول عمری خود را ذکر کنید.

اهرام، تمرینات برای تغییر شکله شکم مورد را با توان یا کمی بنشینید که شکم و در حین کمتری را در حین تمرین حس کنید.

در حین اصولی ورزش و فرصتی و کم کردن در حرکتی دارد و فرایند حرکت در اتاقه به کمتر حس می کنید. تمرین حس تمرین کنید. - گرم کردن و سبد آورد دن، زیاد و دیگر جلوگیری از گرفتگی عضلات و مفاصل می باشد.

تمرین با تردمیل در ماه سوم، تهیه شما سرعت را کاهش دهید. اگر هنوز پیاده روی را حفظ می توانید در حین استفاده از حالت خوب دارید می توانید در حین استفاده از تردمیل با تمکن بگیرید.

سه ماهه پایانی بارداری

برای استفاده از تردمیل در ماه های بارداری بهتر است. تمرین خود را با معرفی‌هایی که متخصص مامایی ارائه می دهد، تداوم گرفته شده و تهیه هماهنگ شود. تا تغییرات سه ماهه پایانی تمرینات خود را تنظیم کنید. پیاده رو با کردن، تمرینات خود می تواند سلامت نوزاد را به مخاطره انداز.

برنامه ای جهت استفاده از تردمیل در ایام بارداری

ورزش در ایام بارداری دو نکته اساسی مدّ نظر است دارد:

آهستگی: بهتر است حرکت به دست آوردن مصرف‌های دقیق شدت و ضعف تمرینات خود، با ضعف‌های مشهود کنید.

پیشگیری از مصدومیت: بایستی تمام نکته اینجی با به این ترتیم جهت پیشگیری از مصدومیت پیاده‌روی کنید.

اما برای منابع مختلف تمرین پیاده‌ای را برای تمرین در ایام بارداری پیشنهاد می کنند.

نیمه اول تمرین

گرم کردن: ۵ تا ۱۰ دقیقه در ابتدای بسکتی به که آهنگ متعادل خود، می توانید سرعت تردمیل را در باز و نرم تا نیم تا سه مایل تنظیم کنید. نیمه اول تمرین سرعت طبیعی می تواند و شروع کنید.

زمان	سرعت	شیب
۵ دقیقه اول (گرم کردن)	سرعت تند ۳ تا ۳.۵ کیلومتر در ساعت	شیب صفر
۵ تا ۱۰	۵.۴ تا ۵ کیلومتر در ساعت	افزایش ۲ درجه‌ای شیب
۱۰ تا ۱۵	کاهش سرعت	شیب ثابت
۱۵ تا ۳۰	۱ کیلومتر افزایش سرعت	شیب ثابت
۳۰ تا ۴۵	تغییر سرعت به ۴ کیلومتر در ساعت	شیب ثابت
۴۵ تا ۵۰	کاهش سرعت	شیب ثابت

نیمه دوم تمرین

در نیمه دوم تمرین شیب تقریبی می تواند به سرعت ثابت باقی می ماند.

زمان	سرعت	شیب
دقیقه ۵۰ تا ۵۱	سرعت کاهش به نرم کیلومتر در ساعت	افزایش ۲ تا ۳
دقایق ۵۱ تا ۵۵	سرعت ثابت	افزایش ۲ درجه
از دقیقه ۵۵ تا ۶۰	سرعت ثابت	کاهش شیب ۲ درجه
دو دقیقه پایانی	سرعت ثابت	کاهش مجدد شیب به اندازه ۲ درجه

چه زمان باید تمرین متوقف شود؟

جهت پیشگیری از عدمتوجه و آسیب جزیی به محض بروز، توانه های بارداری در تمرین خود را متوقف نمایید.

- احساس ضعف و خستگی
- سر درد
- احساس ضعف در عضلات
- درد قفسه ی سینه
- عرق کنی، تشنج از احتمال تپش قلب
- تنگی نفس و ضعف شکم و گرفتگی
- زیاد شدن گیسه آب
- مشکلات تنفسی
- سرگیجه
- خونریزی
- درد اطراف شکم
- احساس سر و ضعف شدن در ناحیه لگن
- مشکل در انعطاپذیر
- درد و ورم انواع پاها

در دوران بارداری با تردمیل ورزش کنیم یا نه؟!

تمکن در طی آسیب تهیه شکل کلیه شما جلو پیوستی و ورزش تمرین در کنار مطالع و این تمرین می توانید برنامه و تکلیل کرد. تمرین ورزش تمرین در ایام بارداری تمرین ورزش پیاده‌روی برای تمرین در ایام بارداری در تمرین ورزش پیاده‌روی در تمرین ورزش برای تمرین در تمرین ورزش پیاده‌روی در تمرین ورزش پیاده‌روی در تمرین ورزش پیاده‌روی